

# Pautas de Administración

## Alutard SQ

Pauta de 7 semanas - 11 inyecciones\*

Vial	Semana	Dosis
Vial 1 100 U-SQ/ml	1	0,1 ml
Vial 2 1.000 U-SQ/ml		0,1 ml
Vial 3 10.000 U-SQ/ml		0,1 ml
Vial 3 10.000 U-SQ/ml	2	0,2 ml
		0,2 ml
	3	0,5 ml
0,5 ml		
Vial 4 100.000 U-SQ/ml	4	0,2 ml
	5	0,4 ml
	6	0,6 ml
	7	1 ml

Pauta de 7 semanas - 7 inyecciones\*\*

Vial	Semana	Dosis
Vial 2 1.000 U-SQ/ml	1	0,3 ml
Vial 3 10.000 U-SQ/ml	2	0,2 ml
	3	0,5 ml
Vial 4 100.000 U-SQ/ml	4	0,1 ml
	5	0,3 ml
	6	0,6 ml
	7	1 ml

**Administración:** Una vez alcanzada la dosis de mantenimiento, el intervalo entre inyecciones irá aumentando de manera gradual. Según el criterio del alergólogo el intervalo se aumentará de 1 a 2, 4 y 6 u 8 semanas.

\* Documentada para todos los alérgenos.

\*\* Documentada para los alérgenos *Phleum* y *Dermatophagoides* mezcla.

## Aquagen SQ

Veneno de Himenópteros

Pauta Convencional Corta - 9 semanas

Vial	Semana	Dosis
Vial 2: 1 µg/ml	1	0,1 ml
Vial 3: 10 µg/ml	2	0,1 ml
	3	0,5 ml
Vial 4: 100 µg/ml	4	0,1 ml
	5	0,2 ml
	6	0,4 ml
	7	0,6 ml
	8	0,8 ml
	9	1 ml

Pauta Cluster - 4 semanas

Vial	Semana	Dosis
Vial 3: 10 µg/ml	1	0,5 ml
Vial 4: 100 µg/ml		0,1 ml
		0,2 ml
		0,3 ml
	2	0,5 ml
	3	0,5 ml
	4	1 ml

Pauta Cluster - 3 semanas

Vial	Semana	Dosis
Vial 3: 10 µg/ml	1	0,5 ml
Vial 4: 100 µg/ml		0,1 ml
		0,2 ml
	2	0,2 ml
	3	0,5 ml
	4	1 ml

**Administración:** En las pautas cluster el intervalo entre dosis será de 30 minutos. Una vez alcanzada la dosis de mantenimiento, ésta se repetirá a las dos semanas para continuar con una inyección mensual.

## SLIToneULTRA

Alérgenos	Envase monodosis diario	Días
Pólenes, hongos y ácaros	50 SRU/día	1-5
	150 SRU/día	6-10
	300 SRU/día	11 - hasta finalizar el tratamiento
Epitelios	50 SRU/día	1-5
	100 SRU/día	6 - hasta finalizar el tratamiento
Cupressus mezcla	50 SRU/día	Todo el tratamiento

## SLIT-Melocotón

Pauta de iniciación

Frasco	Día	Gotas
Frasco 1: 0,05 µg Pru p 3/ml	1	1
		10
Frasco 2: 0,5 µg Pru p 3/ml		1
		10
Frasco 3: 5 µg Pru p 3/ml	2	1
		10
Frasco 4: 50 µg Pru p 3/ml	3	1
		2
		5
		10
	4	20

**Administración:** El tratamiento de iniciación se administrará bajo supervisión directa del especialista con un intervalo entre dosis de 15 minutos. Una vez alcanzada la dosis máxima se administrará en el domicilio 4 gotas del frasco 4, diariamente, hasta acabar el contenido del frasco 4.